

EM米栽培マニュアル

■作付け品種： ななつぼし

■EMぼかし肥と活性液の基準

活性液 100L / 10a 以上

■施肥基準

化学肥料 : 窒素 5kg / 10a 以下

全道慣行栽培 (10kg) の5割以下

	資材名	10a施用量	要素成分			備考
			N	P	K	
施肥例 (泥炭)	BB050	10kg	1.0	1.5	2.0	全層
	875	12kg	2.2	0.8	0.6	側条
	合計		3.2(3.2)	2.3	2.6	
施肥例 (沖積)	BB683	20kg	3.2	3.6	2.6	全層
	444	12kg	1.7	1.7	1.7	側条
	合計		4.9(4.9)	5.3	4.3	

■防除基準

化学農薬 : 成分回数11成分以下

■防除基準									
化学農薬 成分回数11成分以下									
項目	農薬名	成分数	使用方法	成分名	適用病害虫				
殺菌剤	EM2号		0 自家採種	乳酸菌、糸状菌、光合成菌					
殺菌剤	臨機 タフブロック		0 200倍 24時間浸漬	タラロマイセフラバス、SAY-Y-94-01(微生物)	褐色病 他				
殺菌剤	ビームゾル		1 1000倍又は 300倍/25L	トリシクラゾール	いもち病・収穫7日前				
殺菌剤	食酢(穀物酢)※注1		0 50倍		褐色病				
殺菌剤	カスミン液剤		0 1000倍	カスガマイシン	いもち病				
殺虫剤	アドマイヤー顆粒水和剤	いずれか選択	1 500~1000倍 500ml/箱	イミダクロプリド	ウンカ類・イネドロオイムシ・ミズゾウムシ・フタオビコヤガ				
殺虫剤	バズ顆粒水和剤	いずれか選択	1 1000倍 500ml/箱	シアントラニリプロール	イネドロオイムシ・イネミズゾウムシ				
殺虫剤	トレボン粉剤DL	いずれか選択	1 3~4kg	エトフェンプロックス	カメムシ類・ウンカ類・イネドロオイムシ				
殺虫剤	トレボン乳剤	いずれか選択	1 1000~ 2000倍	エトフェンプロックス	カメムシ類・ウンカ類・イネドロオイムシ				
殺虫剤	トレボンEW	いずれか選択	1 1000倍又 は300倍 /25L	エトフェンプロックス	カメムシ類・ウンカ類・イネドロオイムシ				
殺虫剤	臨機 キラップ粉剤DL		1 3~4kg	エチプロール	カメムシ類・ウンカ類・イネドロオイムシ				
除草剤	基幹 ◎ジャイロ1キロ粒剤	いずれか選択	3 1kg/10a	イブフェンカルバゾン、ベンゾピシクロン、ベンゾフェナップ	水田一年生雑草 等				
除草剤	◎ジャイロフロアブル	いずれか選択	3 500ml/10 a	イブフェンカルバゾン、ベンゾピシクロン、ベンゾフェナップ	水田一年生雑草 等				
除草剤	基幹 ペルーガ豆つぶ250		2 250g/10a	ピリミノバクメチル、フェンキトリオン	水田一年生雑草 等				
※注1 食酢は「穀物酢」酸度4.2%を使用します。ラベルの裏に記載されているものを使用してください。									
※注2 畦畔の除草剤散布を禁止します。									
◎は新規薬剤									
・ジャイロ1キロ粒剤…イブフェンカルバゾン(2.5%)ベンゾピシクロン(3.5%)ベンゾフェナップ(8.0%)含有の薬剤									
・ジャイロ1キロ粒剤…イブフェンカルバゾン(4.5%)ベンゾピシクロン(5.4%)ベンゾフェナップ(14.3%)含有の薬剤									